

Diclofenac Cevallos



Diclofenac Dietilamina

Gel dérmico

Venta bajo receta

INDUSTRIA ARGENTINA

DICLOFENAC DIETILAMINA	1.16	g
Dietilamina	0.90	g
Carbopol 940	1.50	g
Alcohol Isopropílico	20.0	g
Propilenglicol	5.00	g
Metilparabeno	0.18	g
Propilparabeno	0.02	g
Agua Destilada csp	100.0	g

Presentación:

Envase conteniendo 1 pomo x 50 g ó 100 g

Envase hospitalario conteniendo 100 pomos x 50 g

Acción terapéutica:

Analgésico, antiinflamatorio y antirreumático percútaneo.

Propiedades y características farmacológicas:

Farmacodinámica: es un antiinflamatorio no esteroide (AINE). En estudios farmacológicos, el diclofenac ha demostrado actividad antiinflamatoria y analgésica. Como otros AINEs este modo de acción es desconocido, su habilidad a inhibir la síntesis de la prostaglandina, sin embargo puede estar involucrado en esta actividad antiinflamatoria. El diclofenac inhibe la síntesis de prostaglandinas que desempeñan una acción importante respecto de la aparición de la inflamación y dolor.

Indicaciones:

Inflamación postraumática de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones, por ej: debida a torceduras, distensiones y contusiones.

Forma localizadas de reumatismo de partes blandas, por ej: tendovaginitis, bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatía.

Formas localizadas de reumatismo degenerativo, por ej.: artrosis de las articulaciones periféricas y de la columna vertebral.

Dosis sugeridas:

Gel: la dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación se aconseja cubrir la zona a tratar con una capa delgada del gel; friccionando suavemente 3 ó 4 veces por día.

El producto puede ser utilizado como medicación única o como complemento del tratamiento con DICLOFENAC por vía oral o inyectable.

Contraindicaciones:

Particularmente, el GEL está contraindicado en pacientes que presenten antecedentes de

alergia al principio activo. Debe ser aplicado únicamente sobre zonas de piel intacta. Debe evitarse el contacto con los ojos o mucosas.

Reacciones adversas:

A la dosis terapéuticas recomendadas, la medicación es generalmente bien tolerada y no provoca efectos colaterales ni secundarios.

En personas hipersusceptibles, pueden llegar a presentarse trastornos leves como prurito, rubelación, erupción cutánea, escozor, que desaparecen espontáneamente o con la suspensión del tratamiento

Ocasionalmente se puede presentar: sarpullido, reacciones de hipersensibilidad y fotosensibilidad; así como también dermatitis por contacto alérgica.

Precauciones y advertencias:

No aplicar sobre heridas abiertas. Evitar el contacto con los ojos o con las membranas mucosas.

No debe ser tomado por boca. Los efectos adversos sistémicos no pueden ser excluidos cuando se aplica sobre grandes áreas de piel o cuando se usa durante períodos prolongados.

Se recomienda no prescribir este medicamento durante el período de embarazo.

El Gel debe ser aplicado únicamente sobre zonas de piel intacta. Debe evitarse el contacto con los ojos o mucosas.

Sobredosis: en caso de sobredosis accidental, de inmediato se debe contactar al médico o recurrir al hospital más cercano.

* **Centro de Referencia Toxicológica - Centro de Intoxicaciones:** (011) 4962-2247 ó (011) 4962-6666

* **Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:** (011)4801-5555

Conservar este medicamento a temperatura ambiente entre 15° C y 30° C. Mantener alejado de la luz y del calor.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N°: 50.270

Elaborado en:

Coronel Mendez 440 - Wilde - Pcia. de Bs. As.

Cevallos Salud S.R.L.

Zapiola 2836 - (C1428CXT) Capital Federal

Director Técnico: Esteban D. Tilosanec, Farmacéutico.